


## 【調査概要】

調査対象：関東在住の40代男性

調査方法：インターネット調査

調査期間：2013年6月21日(金)～24日(月)

■あなたは、普段の性行為の時、以下に該当する症状はありますか。




	N	%
勃起はするが、中折れすることがある	81	14.9%
勃起はするが、以前より硬くならない	134	24.6%
たまに勃起しないことがある	61	11.2%
特にない	340	62.4%
合計	545	100.0%

- 調査対象者全体の約4割(37.6%)が、性行為の際に何らかの勃起障害を自覚している。
- 最も多いのは「硬さ」を気にしている人で24.6%。次に多いのがいわゆる「中折れ」で14.9%。


## ■症状を感じる頻度

### 【勃起はするが、中折れすることがある】




	N	%
いつも	17	21.0%
2回に1回程度	18	22.2%
3回に1回程度	25	30.9%
5回に1回程度	15	18.5%
10回に1回程度	6	7.4%
合計	81	100.0%

### 【勃起はするが、以前より硬くならない】



	N	%
いつも	51	38.1%
2回に1回程度	30	22.4%
3回に1回程度	26	19.4%
5回に1回程度	21	15.7%
10回に1回程度	6	4.5%
合計	134	100.0%

### 【たまに勃起しないことがある】




	N	%
いつも	11	18.0%
2回に1回程度	12	19.7%
3回に1回程度	12	19.7%
5回に1回程度	16	26.2%
10回に1回程度	10	16.4%
合計	61	100.0%

●「中折れ」に関しては「常に中折れする人」が2割以上(21.0%)、2回に1回の人(22.2%)を加えると、半数近くの人が高い頻度で同症状に陥っている。

●また「勃起時の硬さがいつも低下している人」が約4割(38.1%)いるのに加え、「恒常的に勃起しない人」が約2割(18.0%)も存在する。


■これまで、「もしかしたらEDかもしれない」と思ったことがありますか。



	N	%
ある	103	18.9%
ない	442	81.1%
合計	545	100.0%

■その時、医療機関を受診しましたか。


N=103：これまで、「もしかしたらEDかもしれない」と思ったことがある人



	N	%
した	16	15.5%
しなかった	87	84.5%
合計	103	100.0%

- 「自分がEDかもしれない」と自覚した経験者は全体の2割に満たない(18.9%)。
- また、自覚した人の中で、わずか15.5%の人しか医療機関を受診していない。

■ EDは薬で克服できるということを知っていますか。




	N	%
知っている	245	45.0%
知らない	300	55.0%
合計	545	100.0%

●約半数(45.0%)の人が、「EDが薬で克服可能」なことを知っている。

ここには、次項に示すように「ED治療薬の存在認知が高い」ことも関与していると推測できる。

■以下にあげるED治療薬を知っていますか。




	N	%
バイアグラ	491	90.1%
レビトラ	76	13.9%
シアリス	65	11.9%
上記に知っているものはない	54	9.9%
合計	545	100.0%

●ED治療薬の認知度は非常に高く、9割以上の人が何らかの薬剤名を知っている(90.1%)。

●現在日本で使用されている3薬剤の中で、バイアグラの知名度が圧倒的に高い(90.1%)。


■あなたはこれまでED治療薬を購入し服用したことがありますか。



	N	%
医療機関でED治療薬の処方を受けて服用したことがある	20	3.7%
インターネットで購入したことがある	10	1.8%
それ以外の方法で購入し服用したことがある	7	1.3%
購入したり服用したことはない	512	93.9%
合計	545	100.0%


- 「調査対象者全体の約4割(37.6%)が、性行為の際に何らかの勃起障害を意識している」(P.3)にもかかわらず、医療機関を利用したことのある人は、全体のわずか4%弱(3.7%)にすぎない。
- 一方、医療機関の利用以外の方法でED治療薬を購入したことのある人は、計3%強(3.1%)。正式な医療機関で処方を受けた人と、あまり数値(人数)に差が無い。

■インターネットで購入したED治療薬を服用し、体調が悪くなったことがありますか。




●インターネットでED治療薬を購入した人の4割が服用後の体調不良を経験している。

■インターネットで購入したED治療薬の大半が「偽造薬」であり、中には身体に有害な物質が混入されているものもあるということを知っていますか。



●インターネットで購入したED治療薬の大半が「偽造薬」であり、身体に有害で危険な場合があることも、知っている人は3割に満たない(29.2%)。


■ EDになった場合、あなたは医療機関を受診したいと思いますか。



	N	%
思う	278	51.0%
思わない	267	49.0%
合計	545	100.0%

● 「EDになった際に医療機関を受診する」人は、全体の約半数(51.0%)。

■あなたがEDで医療機関を受診する際、医師や看護師、設備や対応等、病院側に求めることはどんなことですか。



	N	%
医師、看護師、窓口を含め 女性スタッフが一人もいない	95	17.4%
女性スタッフが多い	42	7.7%
待ち時間が少ない	246	45.1%
清潔感のある院内	212	38.9%
遅い時間帯までやっている	194	35.6%
駅から近い	125	22.9%
その他	63	11.6%
合計	545	100.0%

● EDで医療機関を受診する際には、「待ち時間の短さ」(45.1%)・「施設の清潔感」(38.9%)・「遅い時間帯での受診」(35.6%)と、利便性を求めている。